


DE QUOI S'AGIT-IL ?

La coronarographie est un examen cardiaque permettant de visualiser les artères coronaires autour du coeur à l'aide de radiographie et d'injection de produit de contraste.

Un cathéter est introduit soit par l'artère radiale qui se situe au niveau du poignet, soit par l'artère fémorale au niveau du pli inguinal.

Selon les résultats de l'examen, il est possible que le médecin effectue une dilatation coronaire avec l'implantation d'un stent.



QUE DOIS-JE FAIRE ?

Avant l'examen

- Être à jeûn au moins 4h précédant l'examen
- Prendre aucun médicament en attendant l'accord de l'équipe médicale. En fonction de votre consultation médicale, certains médicaments peuvent être stoppés.
- Transmettre à l'équipe médicale mon traitement afin d'optimiser la sécurité de ma prise en charge
- Porter mon bracelet d'identification et à la demande du personnel médical il faudra énoncer mon identité.
- Ôter vos bijoux, vos lunettes
- Enfiler une blouse d'hôpital
- Répondre aux questions posées par le médecin et l'infirmier(e) (Antécédents, allergie, médicaments, niveau de dépendance...)
- Une prise de sang et une mise en place d'un cathéter veineux périphérique sera nécessaire pour la mise en place de la perfusion.

Pendant l'examen

- La durée de l'examen dépendra des résultats
- Une anesthésie locale sera réalisée au niveau du poignet afin d'introduire le guide.

Après l'examen

- Retour de l'examen
 - Si l'examen a été effectué par l'artère radiale (poignet), un bracelet compressif doit être maintenu pendant 3h
 - Si l'examen a été effectué par l'artère fémorale (pli inguinal), rester alité pendant 6h avec un pansement compressif.
- Rester à jeûn pendant 1h



Clinique S' Pierre
OTTIGNIES



LA CORONAROGRAPHIE

CONTACT

SERVICE DE CARDIOLOGIE

010 437 349

SECRETARIAT DE CARDIOLOGIE

010 437 347

secretariat.cardiologie@cspo.be



CLINIQUE SAINT-PIERRE

Avenue Reine Fabiola, 9

1340 OTTIGNIES

010 437 211

www.CSPO.be

Membre du réseau
Lid van het netwerk **Huni**

RETOUR À DOMICILE

- Eviter de porter des charges lourdes pendant 3 jours ainsi que de prendre des bains chauds
- Ne pas enlever la croûte au niveau du point de ponction
- Ajuster mes médicaments (Si nécessaire)

