

CONTACT

SERVICE DE RADIOLOGIE

Route 725

Secrétariat : 010 437 247

secretariat.radiologie@cspo.be



CLINIQUE SAINT-PIERRE

Avenue Reine Fabiola, 9

1340 OTTIGNIES

010 437 211

www.cspo.be

Membre du réseau
Lid van het netwerk

Huni

RADI-COMM-0020/09.22



EMBOLISATION DES VARICOCÈLES & VARICES PELVIENNES

QU'EST CE QU'UNE EMBOLISATION VARICOCÈLES ET VARICES PELVIENNES ?

Chez les hommes : La varicocèle est une importante dilatation variqueuse (varices) des veines du cordon spermatique (situées dans les bourses, au-dessus et autour de chaque testicule) existant chez 5 à 10 % de la population masculine et causant des douleurs principalement en fin de journée ou après une activité physique.

L'embolisation consiste à obturer (boucher) la veine dilatée (varice) au niveau du bas ventre.

L'intervention se fait sous anesthésie locale. Nous utilisons principalement des « coils » sortent de petits ressorts, qui ne déclenchent aucune alarme à l'aéroport où dans les magasins.

(0.5cm de long sur 0.5mm d'épaisseur)

Chez les femmes : Les varices pelviennes, (y compris les varices vulvaires et périnéales) causes d'un symptôme de congestion pelvienne.

PRÉPARATION

Une consultation avec le radiologue, au moins 1 mois avant l'intervention pour confirmer l'indication.

Il en profitera pour expliquer le déroulement de l'examen, vérifier les éventuelles allergies (iode...).

Le jour de l'examen :

Hospitalisé pour la journée

- Etre à jeun 5 h avant l'examen, sans boire ni manger
- Le matin de l'intervention, après votre toilette, l'infirmière viendra placer une perfusion.
- Pour votre confort, uriner avant de vous rendre à l'examen
- Vous porterez une blouse d'opéré

DURÉE DE L'EXAMEN | 2h

COMMENT SE DÉROULE L'EXAMEN ?

- Vous serez installé sur la table d'examen
- Le radiologue repère la veine du cou à l'échographie.
- Vous serez recouvert d'un grand drap stérile.
- Après désinfection de la zone et anesthésie locale, le radiologue place un fin cathéter dans la veine du cou. Puis le fait descendre jusqu'aux varices à traiter.
- Une fois les varices repérées, il peut commencer à les traiter avec le matériel (coils). Cela est indolore.

RECOMMANDATIONS

- Après l'examen, vous devrez rester au lit en position assise.
- Attendre 2 heures avant de boire et manger.
- Rester au calme durant 2 semaines (pas de gros efforts physiques, pas de sport intense).
- Un autre rendez-vous sera fixé pour revoir le radiologue 1 mois après l'intervention pour contrôler l'évolution postopératoire.

AVERTIR LE SERVICE SI

- Vous avez des allergies
- Vous souffrez d'une hyperthyroïdie

