

# CONTACT

## Service de Néonatalogie

Néonatalogie

010 437 294



### CLINIQUE SAINT-PIERRE

Avenue Reine Fabiola, 9

1340 OTTIGNIES

010 437 211

[www.CSPO.be](http://www.CSPO.be)

Membre du réseau  
Lid van het netwerk

**Huni**

COMM\_65/08.21



# LA PARENTÉRALE

## DÉFINITIONS

Il s'agit de la mise en place d'un cathéter en silicone, long et souple, que l'on appelle une nouille depuis une veine du bras ou de la jambe (ou du cordon ombilical) jusqu'à l'entrée du cœur. La nouille peut rester en place plusieurs semaines.

La parentérale permet l'administration de solutions concentrées (protéines, sucres et lipides) chez les bébés incapables de se nourrir et/ou chez les bébés trop petits pour digérer.

## COMMENT CELA SE PASSE-T-IL?

Cette technique peut prendre du temps. Elle nécessite que les parents quittent le service pour des raisons d'asepsie (méthode de protection contre les microbes).

Le pédiatre s'habillera stérilement pour placer le cathéter (masque, blouse et gants stériles).

Votre bébé sera installé sur la table chauffante pour une meilleure accessibilité et connecté à un monitoring cardio-respiratoire.

Il recevra une solution glucosée et tétera une sucette s'il le souhaite pour le rassurer et rendre cet acte moins douloureux.

## ENSUITE

Lorsque la mise en place est terminée, une radiographie est réalisée pour vérifier le bon positionnement du cathéter. Si celui-ci est correct, le cathéter sera fixé avec des collants. Le bébé ne pourra pas prendre de bain et sera lavé à l'aide du gant de toilette pour ne pas mouiller le pansement.

La glycémie de votre bébé sera suivie.

Au fil des jours, les quantités de solutions données diminueront dès que votre bébé commencera à boire du lait.

N'hésitez pas à consulter le petit dictionnaire p.24 de notre brochure d'accueil si certains mots vous semblent méconnus.