

CONTACT

SERVICE DE RADIOLOGIE

Route 725

Secrétariat : 010 437 247

secretariat.radiologie@cspo.be



CLINIQUE SAINT-PIERRE

Avenue Reine Fabiola, 9

1340 OTTIGNIES

010 437 211

www.cspo.be

Membre du réseau
Lid van het netwerk

Huni

RADI-COMM-0031/09.22



OPACIFICATION D'UN PICC LINE, PAC ET CATHÉTER D'HÉMODIALYSE

QU'EST CE QU'UNE OPACIFICATION ?

C'est l'injection de produit de contraste à base d'iode dans le cathéter Picc ou port à cath afin de voir s'il n'y a pas de thrombus ou sténose.

L'examen est souvent demandé lorsqu'il n'y a pas de reflux sanguin ou qu'il y a un doute sur la perméabilité du cathéter.

FAUT-IL UNE PRÉPARATION ?

Vous êtes porteur d'un port à cath : s'assurer que l'aiguille soit placée avant l'examen.

AVERTIR LE SERVICE, SI :

- Vous avez des allergies
- Vous avez des problèmes de thyroïdes

COMMENT SE DÉROULE L'EXAMEN ?

- Dès votre arrivée, le personnel soignant vous expliquera en détail le déroulement de l'examen.
- Vous serez couché sur la table d'examen.
- Après désinfection le radiologue injecte le produit de contraste par le cathéter sous contrôle radiographique.
- Vous ressentirez peut-être une sensation de chaleur à l'injection du produit iodé.
- L'examen terminé, vous pourrez repartir à l'hôpital de jour ou à domicile.

Si vous avez un PAC, n'oubliez pas de retourner à l'hôpital de jour pour enlever l'aiguille.

DURÉE DE L'EXAMEN | 30 minutes



Enceinte ?
Vous pourriez l'être ?

Merci d'informer le personnel soignant **avant** l'examen

Port-à-cath



Cathéter central périphérique

